Continue

primer grado?Despejamos la x de ecuación de primer grado obtenida:En conclusión, Miguel tiene 14 y Mara el triple, que es 42.Si un padre tiene 14 años y sus hijos 18 y 20 años, ¿cuántos años deben pasar para que la suma de los padres sea la suma de los hijos?En este problema, la incgnita es los aos que deben pasar para que se cumpla una de edades del enunciado. Entonces, para calcular la edad de alguien en el futuro, se debe sumar su edad actual ms x. En consecuencia, la ecuación lineal del problema es:Finalmente, hallamos el valor de x de la ecuación. De modo que deben pasar cuatro aos para que la suma de las edades de los hijos sea equivalente a la edad del padre. En una sala hay 451 personas. Además, se sabe que hay 47 mujeres ms que hombres. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la sala?Si llamamos x al nmero de hombres que hay en la sala, el nmero de mujeres ser x+47.As pues, el enunciado del problema dice que la suma del nmero de hombres y de mujeres da 451, lo que significa que se debe cumplir la siguiente igualdad:Ahora solucionamos la ecuación de primer grado.Y, por ltimo, interpretamos la solucin obtenida. En la sala hay 202 hombres, por otro lado, el nmero de mujeres es 202 ms 47, es decir, 249 mujeres. En un parking de coches y motos hay 83 vehculos. Si en total se han contado 256 ruedas, ¿cuántos coches y cuántas motos hay en el parking?Para resolver este problema, llamaremos x al nmero de coches que hay en el parking. De modo que el nmero de motos ser la diferencia entre 83 y x.Como sabes, un coche tiene cuatro ruedas y una moto tiene dos ruedas. Por lo tanto, si en el parking hay un total de 256 ruedas, se debe cumplir la siguiente ecuación:As pues, resolvemos la ecuación de primer grado con parntesis del problema:En conclusin, en el parking hay 45 coches y, por otro lado, el nmero de motos es la diferencia entre 83 y 45, que es 38.Un nmero aumentado en 9 unidades es igual al mismo nmero multiplicado por 4. De qu nmero se trata?En este caso, la incgnita del problema es el nmero que queremos hallar:As pues, el enunciado nos dice que sumar 9 al nmero equivale a multiplicar dicho nmero por 4. Por lo tanto, se debe cumplir la siguiente ecuación:Finalmente, resolvemos la ecuación de primer grado del problema:Hemos dejado el coche 6 horas en un parking. Si hemos pagado con un billete de 20 y nos han dado de cambio 11, ¿cuál es el precio por hora del parking?En este problema queremos averiguar la tarifa del parking, as que la incgnita del problema ser:A partir de la informacin del enunciado del problema, planteamos la ecuación de primer grado:Y, por ltimo, resolvemos la ecuación:De modo que el parking cobra 1,5/hora por dejar el coche dentro.Carlos hace una compra de 7. Entonces, el doble del dinero que le queda ms 4 da justo el dinero que tena al principio. ¿Cuántos euros tena Carlos antes de hacer la compra?La incgnita que queremos determinar en este problema es el valor de cada parmetro de la frmula general de la ecuación de primer grado con parntesis del problema:En conclusin, Carlos tena al principio, antes de realizar la compra, 10. Ver: cmo resolver ecuaciones de segundo gradoResuelve la siguiente ecuación de segundo grado completa:Se trata de una ecuación de segundo grado, por lo que tenemos que usar la frmula general para resolverla:As pues, identificamos el valor de cada parmetro:Ahora sustituimos el valor de cada parmetro en la frmula general:Y hacemos los clculos para hallar las dos soluciones de la ecuación de segundo grado:Calcula las soluciones de la siguiente ecuación de segundo grado:Para determinar las soluciones de la ecuación de segundo grado, tenemos que aplicar la frmula general de este tipo de ecuaciones:De modo que primero debemos averiguar el valor de cada parmetro de la frmula:Luego sustituimos el valor de cada parmetro en la frmula de las ecuaciones de segundo grado:Por ltimo, calculamos las operaciones resultantes para obtener las dos soluciones de la ecuación cuadrática:Resuelve la siguiente ecuación cuadrática completa:La frmula general para resolver ecuaciones cuadráticas completas es la siguiente:As pues, el parmetro a es el coeficiente del trmino cuadrático, el parmetro b es el coeficiente del trmino lineal y el parmetro c es el trmino independiente de la ecuación:Sustituimos el valor de cada parmetro en la frmula general:Hacemos los clculos:Sin embargo, las raíces cuadradas de nmeros negativos no tienen ninguna solucin real, por lo tanto, la ecuación de segundo grado tampoco tiene ninguna solucin real.Encuentra las soluciones de la siguiente ecuación cuadrática:La frmula general de las ecuaciones cuadráticas es la siguiente:As pues, identificamos cuanto vale cada parmetro de la frmula:Sustituimos el valor de cada parmetro en la frmula:Por ltimo, hacemos los clculos para encontrar las dos soluciones de la ecuación cuadrática:Halla las soluciones de la siguiente ecuación de segundo grado:Antes de utilizar la frmula general, tenemos que simplificar los trminos. As que pasamos todos los trminos al mismo miembro de la ecuación.Y ahora sumamos los trminos que le queda ms 4 da justo el dinero que tena al principio. ¿Cuántos euros tena Carlos antes de hacer la compra?La incgnita que queremos determinar en este problema es el valor de cada parmetro de la frmula general de la ecuación de primer grado con parntesis:En primer lugar, tenemos que quitar los parntesis y, para ello, debemos aplicar la propiedad distributiva:Luego colocamos todos los monomios en el miembro izquierdo de la ecuación:Grupamos los trminos con el mismo grado.Y, finalmente, utilizamos la frmula de la ecuación de segundo grado:Soluciono la siguiente ecuación de segundo grado con parntesis y corchetes:El primer paso del procedimiento consiste en eliminar todos los parntesis. Pero en este problema tenemos un parntesis dentro de un corcheto, por lo que tenemos que aplicar la propiedad distributiva dos veces:Trasponemos todos los elementos al miembro izquierdo de la ecuación:Sumamos y restamos los trminos con el mismo grado:En este problema tenemos una ecuación de segundo grado completa, as que aplicamos la frmula general de la ecuación cuadrática:Resuelve la siguiente ecuación de segundo grado con fracciones:En primer lugar, calculamos el mnimo comn múltiplo de los denominadores:Luego multiplicamos cada trmino de la ecuación por el valor hallado del mnimo comn múltiplo:Simplificamos las fracciones dividiendo el 6 entre cada denominador:Multiplicamos:Pasamos todos los monomios al primer miembro de la ecuación:Y agrupamos los trminos del mismo grado:De forma que hemos obtenido una ecuación de segundo grado completa, as que utilizamos la frmula general para resolverla:Calcula la siguiente ecuación cuadrática con fracciones:Primero de todo, debemos averiguar el mnimo comn múltiplo de los denominadores de las fracciones, que en este problema es 12:Por lo que multiplicamos cada trmino de la ecuación por 12:Simplificamos las fracciones de la ecuación dividiendo el 12 entre cada denominador:Resolvemos las multiplicaciones:Movemos todos los trminos al miembro izquierdo de la ecuación:Grupamos los trminos semejantes:Y, finalmente, aplicamos la frmula general de las ecuaciones cuadráticas:Soluciono la siguiente ecuación de segundo grado con fracciones y parntesis:La ecuación del problema es de grado 2 (porque tiene una x elevada al cuadrado) y est formada por fracciones y parntesis. Por tanto, lo primero que debemos hacer es operar los parntesis aplicando la propiedad distributiva:Una vez hemos simplificado los parntesis, calculamos el mnimo comn múltiplo de los denominadores:Ahora multiplicamos toda la ecuación por el mcm hallado:Simplificamos las fracciones de la ecuación dividiendo el 12 entre cada denominador:Hallamos las multiplicaciones:Trasponemos los trminos necesarios para que todos queden en el primer miembro de la ecuación:Sumamos y restamos los trminos semejantes:Y, por ltimo, empleamos frmula de la ecuación de segundo grado. Ver: cmo resolver ecuaciones de segundo grado incompletasResuelve la siguiente ecuación de segundo grado incompleta:Se trata de una ecuación de segundo grado incompleta con ausencia del trmino b, por lo tanto, primero despejamos la incgnita:Y luego hacemos la raz cuadrada en ambos miembros de la ecuación:De modo que las dos soluciones de la ecuación de segundo grado incompleta son +3 y -3.Calcula la siguiente ecuación cuadrática incompleta:A la ecuación de segundo grado incompleta le falta el coeficiente b, en consecuencia, primero tenemos que despejar el trmino cuadrático. As que pasamos al otro lado el -4 cambiándole el signo:En segundo lugar, pasamos el coeficiente de x2 al otro miembro dividiendo:Y, por ltimo, sacamos la raz cuadrada de ambos miembros de la igualdad:Por lo que las dos soluciones de la ecuación cuadrática incompleta son +1 y -1.Soluciono la siguiente ecuación de segundo grado incompleta:A la ecuación de segundo grado incompleta le falta el coeficiente c. Por lo tanto, primero tenemos que sacar el factor comn x de la ecuación:Despus igualamos cada factor del producto anterior a cero:Ahora ya sabemos que una de las soluciones de la ecuación ser x=0. Pues ara hallar la otra solucin resolvemos la ecuación lineal resultante del paso anterior:En definitiva, las dos soluciones de la ecuación son:Determina la siguiente ecuación de segundo grado incompleta:A la ecuación cuadrática incompleta le falta el coeficiente c. Por lo tanto, primero extraemos el factor comn x de la ecuación:Igualamos cada factor de la multiplicación anterior a cero:Con lo que una de las soluciones de la ecuación ser x=0. Entonces, resolvemos la ecuación de primer grado obtenida en el paso anterior para determinar la otra solucin:Por tanto, las dos soluciones de la ecuación cuadrática incompleta son:Resuelve la siguiente ecuación de grado 2 incompleta:En este problema a la ecuación de segundo grado incompleta le falta tanto el coeficiente b como el coeficiente c, lo que significa que las dos soluciones de la ecuación son x=0 (solucin doble).Halla la x de la siguiente ecuación de segundo grado incompleta:La ecuación de segundo grado incompleta no tiene trmino lineal, as que el resultado de multiplicar las dos edades es igual a 48. Por lo tanto:Una vez hemos encontrado la ecuación cuadrática del problema, la resolvemos:As pues, las dos posibles soluciones son +4 y -4. Pero, evidentemente, una edad no puede ser negativa, por lo que la nica solucin factible es +4.De forma que las edades son:Hallar un nmero cuyo doble ms su cuadrado da 195.En este problema la nica incgnita posible es el nmero que queremos calcular:Matemáticamente, el doble del nmero que buscamos y su cuadrado son:El enunciado explica que la suma del doble del nmero ms su cuadrado es igual a 195, por lo tanto, la ecuación del problema es:As que resolvemos la ecuación de segundo grado completa del problema aplicando la frmula general:En este problema, el enunciado no especifica el signo del nmero, de manera que puede ser tanto +13 como -15. De hecho, si sustituimos las dos soluciones en la ecuación cuadrática del problema, podemos comprobar que ambas soluciones cumplen con la ecuación:La longitud de un campo de fbol hace 30 metros ms que de anchura. Y su rea es de 7000 m2. ¿Cules son las dimensiones del campo?En primer lugar, identificamos la incgnita del problema. En este caso diremos que x es igual a los metros de ancho del campo, pero también se podra solucionar poniendo como incgnita la longitud del campo.As pues, el problema dice que la longitud del campo mide 30 metros ms que su ancho, por tanto:Asimismo, el problema dice que el rea del campo es 7000 m2, por lo tanto, la ecuación cuadrática del problema es:Por ltimo, resolvemos la ecuación cuadrática del problema es:Por lo tanto, la ecuación de primer grado resultante:En definitiva, el lado del cuadrado mide 600 cm.Determina cuanto miden los catetos de un triángulo rectángulo si juntos suman 17 cm y su hipotenusa mide 13 cm.Para este problema llamaremos x a un cateto del triángulo:De modo que si la longitud de los dos catetos suman 17 cm, el otro cateto debe medir:Ahora podemos encontrar una ecuación que relaciona los tres lados del triángulo aplicando el teorema de Pítagoras:Resolvemos la identidad notable con la frmula de una resta al cuadrado original:Como el rea de un cuadrado se calcula multiplicando sus lados entre s, el rea original del cuadrado era:El enunciado nos dice que si aumentamos 2 m la longitud del lado, su rea se multiplica por 4. Por lo tanto, la ecuación de segundo grado del problema es:Ahora operamos los parntesis aplicando la propiedad distributiva y agrupamos los trminos semejantes:Y solucionamos la ecuación cuadrática del problema utilizando la frmula general:Logicamente, la longitud inicial del cuadrado no poda ser negativa, por lo que la nica solucin posible es x=2.Determina dos nmeros positivos que se diferencian en 6 unidades y su producto es igual a 112.Aunque el planteamiento de este problema se podra solucionar con dos incgnitas, para no tener que calcular un sistema de ecuaciones vamos a resolverlo mediante una ecuación de segundo grado con una sola incgnita.En este caso llamaremos x al nmero ms grande de los dos:Como la diferencia entre los dos nmeros es de 6 unidades, el otro nmero ser:El producto de los dos nmeros debe ser 112, por lo tanto:Eliminamos el parntesis aplicando la propiedad distributiva:Y, por ltimo, resolvemos la ecuación de segundo grado:En este problema, el enunciado solo admite nmeros positivos. En consecuencia, la nica solucin factible del problema es:Si aumentamos la base de un cuadrado 25 cm y disminuimos su altura en 2 cm, obtenemos un rectngulo con la misma rea. Calcula cuanto mide el lado del cuadrado.La incgnita del problema se trata del dato que queremos calcular, esto es, el lado del cuadrado:De forma que los lados del rectngulo sern:Tanto el rea de un cuadrado como la de un rectngulo se calculan con las siguientes frmulas:Por lo tanto, si ambas reas deben ser iguales, se debe verificar la siguiente igualdad:Hacemos las multiplicaciones:Y resolvemos la ecuación de segundo grado del problema:En este problema las dos incgnitas elevadas al cuadrado se anulan, por lo que simplemente tenemos que despejar la x de la ecuación de primer grado resultante:En definitiva, el lado del cuadrado mide 600 cm.Determina cuanto miden los catetos de un triángulo rectángulo si juntos suman 17 cm y su hipotenusa mide 13 cm.Para este problema llamaremos x a un cateto del triángulo:De modo que si la longitud de los dos catetos suman 17 cm, el otro cateto debe medir:Ahora podemos encontrar una ecuación que relaciona los tres lados del triángulo aplicando el teorema de Pítagoras:Resolvemos la identidad notable con la frmula de una resta al cuadrado original:Como el rea de un cuadrado se calcula multiplicando sus lados entre s, el rea original del cuadrado era:El enunciado nos dice que si aumentamos 2 m la longitud del lado, o la edad de Juan, o la edad de Marta. Aqu lo hemos resuelto con la edad de Juan, pero también se podra plantear el problema escogiendo la edad de Marta como incgnita.El enunciado del problema dice que Marta tiene el triple de edad que Juan. Por lo tanto, la edad de Marta corresponde a la siguiente expresin:Entonces, el problema dice que el resultado de multiplicar las dos edades es igual a 48. Por lo tanto:Una vez hemos encontrado la ecuación cuadrática del problema, la resolvemos:As pues, las dos posibles soluciones son +4 y -4. Pero, evidentemente, una edad no puede ser negativa, por lo que la nica solucin factible es +4.De forma que las edades son:Hallar un nmero cuyo doble ms su cuadrado da 195.En este problema la nica incgnita posible es el nmero que queremos calcular:Matemáticamente, el doble del nmero que buscamos y su cuadrado son:El enunciado explica que la suma del doble del nmero ms su cuadrado es igual a 195, por lo tanto, la ecuación del problema es:As que resolvemos la ecuación de segundo grado completa del problema aplicando la frmula general:En este problema, el enunciado no especifica el signo del nmero, de manera que puede ser tanto +13 como -15. De hecho, si sustituimos las dos soluciones en la ecuación cuadrática del problema, podemos comprobar que ambas soluciones cumplen con la ecuación:La longitud de un campo de fbol hace 30 metros ms que de anchura. Y su rea es de 7000 m2. ¿Cules son las dimensiones del campo?En primer lugar, identificamos la incgnita del problema. En este caso diremos que x es igual a los metros de ancho del campo, pero también se podra solucionar poniendo como incgnita la longitud del campo.As pues, el problema dice que la longitud del campo mide 30 metros ms que su ancho, por tanto:Asimismo, el problema dice que el rea del campo es 7000 m2, por lo tanto, la ecuación cuadrática del problema es:Por ltimo, resolvemos la ecuación cuadrática del problema:En este problema, la interpretacin de las soluciones obtenidas es importante, porque una dimensin de un campo no puede ser negativa. De modo que si la longitud de los dos catetos suman 17 cm, el otro cateto debe medir:Ahora podemos encontrar una ecuación que relaciona los tres lados del triángulo aplicando el teorema de Pítagoras:Resolvemos la identidad notable con la frmula de una resta al cuadrado original:Como el rea de un cuadrado se calcula multiplicando sus lados entre s, el rea original del cuadrado era:El enunciado nos dice que si aumentamos 2 m la longitud del lado, su rea se multiplica por 4. Por lo tanto, la ecuación de segundo grado del problema es:Ahora operamos los parntesis aplicando la propiedad distributiva y agrupamos los trminos semejantes:Y solucionamos la ecuación cuadrática del problema utilizando la frmula general:Logicamente, la longitud inicial del cuadrado no poda ser negativa, por lo que la nica solucin posible es x=2.Determina dos nmeros positivos que se diferencian en 6 unidades y su producto es igual a 112.Aunque el planteamiento de este problema también se podra hacer con una nica incgnita, en este caso lo resolveremos mediante un sistema de ecuaciones de segundo grado con dos incgnitas ya que as es ms fcil.En este caso llamaremos x a la base del rectngulo e a y a su altura:Si el permetro del rectngulo es de 76 cm, se debe cumplir la siguiente igualdad:Por otro lado, el rea del rectngulo es de 345 cm2, por lo tanto:De este modo ya tenemos las dos ecuaciones que forman el sistema:Resolvemos el sistema de ecuaciones del problema con el mtodo de sustitucin. As que despejamos la variable x de la primera ecuación:Sustituimos la expresin obtenida en la otra ecuación:Y resolvemos la ecuación cuadrática del problema aplicando la frmula general:De modo que el valor de la incgnita x depende del valor de z. Por lo tanto, el rectngulo del problema tiene como base 23 cm y como altura 15 cm, o viceversa, su base mide 15 cm y su altura 23 cm. Ambas soluciones son posibles ya que el enunciado no especifica qu lado es ms grande.Calcula los dos nmeros impares positivos que son consecutivos y cuya suma de cuadrados es igual a 802.Para forzar que un nmero sea impar, este se debe expresar algebraicamente de la siguiente manera:Por lo tanto, el siguiente nmero impar ser:Segn el enunciado del problema, la suma de los cuadrados de los dos nmeros da como resultado 802, por tanto:Calculamos las 2 identidades notables con la frmula del cuadrado de una suma:Y, por ltimo, resolvemos la ecuación de segundo grado del problema:En este problema, el enunciado solo admite nmeros positivos. Por lo que los dos nmeros que satisfacen el enunciado son: En esta pgina vamos a resolver ecuaciones de primer grado paso a paso. Comenzamos con ecuaciones muy simples e iremos aumentando su dificultad. En las ecuaciones tendremos sumas, restas, productos y cocientes de monomios sin parte literal (es decir, nmeros) y de monomios con la parte literal (x) (como 2x) (tra: 3x) (2)). Resolver una ecuación consiste en encontrar el valor que debe tomar la incgnita (x) para que se cumpla la igualdad. Podemos comprobar si la solucin encontrada es correcta sustituyendo la incgnita (x) por la solucin. Como regla general, una ecuación de primer grado tiene una nica solucin. No obstante, puede darse el caso de que no exista ninguna o que existan infinitas (veremos alg ejemplo de estos casos). Enlace: Ejercicios interactivos de lgebra bsica Resolvemos: Para resolver la ecuación, debemos pasar los monomios que tienen la incgnita a uno lado de la igualdad y los que no tienen la incgnita al otro lado. Como 8 est restando en la derecha, pasa sumando al lado izquierdo: Como (x)2 est restando en la izquierda, pasa restando a la derecha: Ahora que ya tenemos separados los monomios con y sin la incgnita, podemos sumarlos. En la izquierda, sumamos (2+8) y, en la derecha, -(x+x): Para ver con claridad el paso siguiente, escribimos (2x) como un producto: Para terminar, debemos pasar el coeficiente de la incgnita (el nmero 2 que multiplica a x(x)) al lado izquierdo. Como el nmero 2 est multiplicando, pasa dividiendo: Simplificando la fracción. Por tanto, la solucin de la ecuación es (x = 5). Para comprobar la solucin, sustituimos (x) por 5 en la ecuación para confirmar que se verifica: Como hemos obtenido una igualdad verdadera (-3 es igual a -3), la solucin es correcta. Si, por el contrario obtenemos una igualdad falsa, significa que hemos cometido alg error en la resolucin de la ecuación. Resolvemos: Escribimos los monomios con incgnita en la izquierda y los que no tienen incgnita en la derecha. Como (5x) est sumando en la derecha, pasa restando a la izquierda. El nmero 1 de la izquierda est restando, as que pasa sumando al otro lado: Sumamos los monomios en cada lado: Es decir, Para despejar la incgnita, debemos pasar el coeficiente de la incgnita a la derecha. Como est multiplicando, pasa dividiendo (en el signo negativo incluido): Finalmente, simplificamos la fracción: Por tanto, la solucin es (x = -3). Comprobamos la solucin sustituyendo en la ecuación: Resolvemos: Escribimos en la izquierda los trminos que tienen la incgnita y en la derecha los que no la tienen: Simplificamos ambos lados: Hemos obtenido una obviedad. Esto significa que la incgnita puede tomar cualquier valor. Por tanto, todos los nmeros reales son solucin de la ecuación: Comprobamos que la ecuación se cumple para cualquier nmero. Sustituimos, por ejemplo, (x = 1) en la ecuación: Nota: Hemos comprobado para (x = 1), pero cualquier nmero cumple la ecuación. Obviamente, no podemos comprobar todos los nmeros reales. Resolvemos: En esta ecuación tenemos un parntesis. Un parntesis sirve para representar que una misma operacin se aplica a un grupo de monomios. El nmero que est delante del parntesis est multiplicándolo, as que podemos escribir la ecuación como En la ecuación, el parntesis nos dice que debemos multiplicar los monomios 1 y (2x) por 2. Por tanto, podemos eliminar el parntesis escribiendo su significado: Calculamos los productos: Finalmente, resolvemos la ecuación anterior: Por tanto, la solucin de la ecuación es (x = 2). Comprobamos la solucin sustituyendo (x = 2) en la ecuación: Resolvemos: Eliminamos el parntesis del mismo modo que hicimos en la Ecuación 4, pero no debemos olvidar que uno de los sumandos del parntesis tiene signo negativo: Comprobamos la solucin sustituyendo (x = 1) en la ecuación: Enlace: Ms ecuaciones con parntesis. Resolvemos: Generalmente, es mucho ms rpido resolver ecuaciones sin fracciones. Como siempre tenemos que multiplicar una ecuación por un nmero distinto de 0, la multiplicamos por 3: Hemos multiplicado por 3 porque es el denominador de las dos fracciones y, por tanto, se anulan los denominadores. Comprobamos la solucin sustituyendo (x = 1/2) en la ecuación: Resolvemos: Si multiplicamos por 3 la ecuación, desaparecen las fracciones cuyo denominador es 3. Pero quedar la fracción cuyo denominador es 2. Para eliminar los denominadores de un solo paso, multiplicamos la ecuación por el mnimo comn múltiplo de los denominadores. El mnimo comn múltiplo de 2 y 3 es 6. Por tanto, multiplicamos por 6 la ecuación: Comprobamos la solucin sustituyendo (x = -2) en la ecuación: Enlace: Ms ecuaciones con fracciones. Resolvemos: En esta ecuación tenemos una fracción, pero est multiplicando al parntesis. Podemos multiplicar toda la ecuación por su denominador o bien operar con ella. Nosotros escogemos la segunda opcin por variar de procedimiento. Eliminamos el parntesis multiplicando sus sumandos por el coeficiente 1/2. La solucin de la ecuación es 0. Comprobamos la solucin sustituyendo (x = 0) en la ecuación: Resolvemos: Eliminamos el parntesis: Calculamos los productos y resolvemos la ecuación. Recordad que debemos aplicar la regla de los signos: Hemos obtenido una igualdad falsa. Esto significa que no existe ningn valor para (x) que haga que la ecuación se cumpla. Por tanto, la ecuación no tiene ninguna solucin. Enlace: Ms ecuaciones con fracciones y con parntesis. Resolvemos: Multiplicamos toda la ecuación por 2 para eliminar la fracción de la izquierda: Como el parntesis est multiplicado por 1, es como si no estuviera: Hemos visto en ecuaciones anteriores que el coeficiente que multiplica a la incgnita pasa al otro lado dividiendo. En esta ecuación tenemos, adems, un denominador. Como 3 est dividiendo a la incgnita, pasa multiplicando: Resolvemos: Primero que nada, podemos multiplicar el -2 del parntesis para eliminar una de las fracciones: De este modo, el lugar de tres denominadores distintos, tenemos solo dos (6 y 2) y su mnimo comn múltiplo es 6. Multiplicamos toda la ecuación por 6 y resolvemos la ecuación: Resolvemos: Podemos pasar el denominador del lado derecho multiplicando al lado izquierdo: Multiplicamos por 4 el parntesis de la izquierda y por -1 el de la derecha: Observad que tenemos que escribir el numerador entre parntesis al eliminar el denominador. Continuamos resolviendo la ecuación: Resolvemos: Eliminamos el parntesis de dentro multiplicando por -2: Multiplicamos la ecuación por el mnimo comn múltiplo de los denominadores (3 y 5), es decir, por 15: Eliminamos el parntesis que queda y resolvemos la ecuación: Podemos simplificar la fracción dividiendo numerador y denominador entre su mximo comn divisor, es decir, 4: Resolvemos: Podemos pasar el denominador 6 multiplicando al otro lado: Eliminamos el parntesis que queda multiplicando por 3: Hemos obtenido la falsa igualdad 0 = -1, independientemente del valor que tome (x). Esto significa que esta ecuación no tiene solucin porque sea cual sea el valor de (x) se obtiene una igualdad falsa. Por tanto, la ecuación no tiene ninguna solucin. Ms ecuaciones. Revisado por Rafael C. Asth Profesor de Matemática y Física Una ecuación en matemática es una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o ms incgnitas que deben ser resueltas.Las ecuaciones sirven para resolver diferentes problemas matemáticos, geomtricos, qumicos, fsicos o de cualquier otra ndole, que tienen aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la investigacin y desarrollo de proyectos cientficos.Las ecuaciones pueden tener una o ms incgnitas, y tambin puede darse el caso de que no tengan ninguna solucin o de que sea posible ms de una solucin.Partes de una ecuaciónLas ecuaciones estn formadas por diferentes elementos. Veamos cada uno de ellos.Cada ecuación tiene dos miembros, y estos se separan mediante el uso del signo igual (=).Cada miembro est conformado por trminos, que corresponden a cada uno de los monomios.Los valores de cada monomio de la ecuación pueden ser de diferente teor. Por ejemplo: constantes; coeficientes; variables; funciones; vectores.Las incgnitas, es decir, los valores que se desean encontrar, se representan con letras. Veamos un ejemplo de ecuación.Ejemplo de ecuación algebraicaVer tambin: Polinomio, lgebra y FrmulaTipos de ecuacionesExisten diferentes tipos de ecuaciones de acuerdo a su funcin. Conozcamos cules son.1. Ecuaciones algebraicasLas ecuaciones o expresiones algebraicas, que son las fundamentales, se clasifican o subdividen en los diversos tipos que se describen a continuacin.a. Ecuaciones de primer grado o ecuaciones linealesSon las que involucran una o ms variables a la primera potencia y no presenta producto entre variables.Por ejemplo: a + b = 0Veamos tambin Ecuacin de primer grado y Ejercicios de ecuaciones de primer grado (una incgnita)b. Ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticasEn este tipo de ecuaciones, el trmino desconocido est elevado al cuadrado.Por ejemplo: ax2 + bx + c = 0Veamos tambin Ecuacin de segundo grado.c. Ecuaciones de tercer grado o ecuaciones cbicasEn este tipo de ecuaciones, el trmino desconocido est elevado al cubo.Por ejemplo: ax3+ bx2 + cx + d = 0d. Ecuaciones de cuarto gradoAquellas en las que a, b, c y d son nmeros que forman parte de un cuerpo que puede ser o a. Por ejemplo: ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 02. Ecuaciones trascendentesSon un tipo de ecuación que no se puede resolver solo mediante operaciones algebraicas, es decir, cuando incluye al menos una funcin no algebraica. Por ejemplo, 3. Ecuaciones funcionalesSon aquellas cuya incgnita son una funcin de una variable. Por ejemplo, 4. Ecuaciones integralesAquella en que la funcin incgnita se encuentra en el integrando.5. Ecuaciones diferencialesAquellas que ponen en relacin una funcin con sus derivadas.Vea tambin: Variable (Matemáticas) Regla de tres Ley de los Signos Cmo citar: (22/11/2023). "Ecuaciones". En. Significados.com. Disponible en: Consultado: Puntos claveConsta de dos lados conectados por un signo igual, con valores conocidos e incgnitas que determinar.Hay que encontrar el valor exacto de las incgnitas que mantiene la igualdad de ambos lados de la ecuación.Usualmente las incgnitas se representan con letras como x, y, z, son los valores que buscamos encontrar para mantener la igualdad. Una ecuación es la igualdad existente entre dos expresiones algebraicas, se conectan a travs del signo de igual (=). Intervienen diferentes datos conocidos y uno o varios valores desconocidos, llamadas incgnitas. El objetivo es encontrar qu valor debe tomar la incgnita para que la igualdad sea cierta. Dicho de una manera mucho ms simple, una ecuación es bsicamente una forma de decir que dos cosas son iguales, usando nmeros y smbolos. Imagina que tienes una balanza con pesos en ambos lados: tu objetivo es mantenerla equilibrada. En las ecuaciones, tratamos de encontrar el valor de algo que no sabemos (llamado incgnita), de manera que ambos lados de la ecuación se mantengan iguales. Consejo: Las incgnitas suelen representarse con letras como x, y, z, u, v, especialmente las ms cercanas al final del alfabeto. Si planteamos la ecuación algebraica, como la mostradaa continuacin, podremos ver en ella los elementos sealados anteriormente:Veamos: 4x + 10 = x + 14Aqu tenemos: Dos miembros: el izquierdo (4x + 10) y el derecho (x +14). Un signo igual que indica que ambos lados deben tener el mismo valor. Una incgnita, en este caso la letra x, que es el valor que queremos descubrir. Igualdad matemtica es la proposicin de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a travs del signo =, ver ms Una ecuación solo es verdadera cuando la incgnita toma un valor especfico. Resolver una ecuación significa descubrir ese valor usando operaciones matemáticas. El grado de una ecuación viene dado por el mayor exponente de la incgnita. Segn eso, podemos clasificarlas en: Ecuaciones de primer grado (lineales): la incgnita est elevada a 1. Ecuaciones de segundo grado (cuadráticas): la incgnita est elevada a 2. Ecuaciones de tercer grado (cbicas): la incgnita est elevada a 3. Y as sucesivamente, hasta llegar a ecuaciones de grado n. Antes de resolver un ejemplo sobre las ecuaciones de primer grado, conviene indicar las siguientes propiedades: Cuando un valor que est sumando pasa a otro lado de la ecuación, se le pone un signo menos. Si un valor que est restando pasa al otro lado del igual, se le pone un signo ms. Cuando un valor que est dividiendo pasa a otro lado de la ecuación, multiplicar a todo lo que haya en el otro lado. Si un valor est multiplicando pasa al otro lado del igual, entonces pasar dividiendo a todo lo que haya en la otra parte. Es indiferente, pasar de lado izquierdo a derecho o de derecho a izquierdo del igual. Lo importante es no olvidar los cambios de signo. Adems, no importa hacia qu lado despejemos las incgnitas. Para ver a fondo el proceso de resolucin , vamos a plantear la siguiente: 4x + 10 = 25 x Para resolver esta ecuación debemos despejar la incgnita. Para ello, en primer lugar, se procede a agrupar los trminos semejantes. Bsicamente, esta parte consiste en pasar todas las incgnitas al lado izquierdo y todas las constantes al lado derecho. As tenemos. 4x + x = 25 10 Sumando y restando estos trminos semejantes, tenemos. 5x = 15 Finalmente, se procede ahora a despejar la incgnita ydeterminar su valor. x = 15/5 x = 3 De esta forma el valor de la incgnita da como resultado 3. Entender las ecuaciones es clave en matemáticas, economía, fsica y muchas otras disciplinas.Te ayudan a modelar situaciones reales, resolver problemas y tomar decisiones basadas en datos. También te puede interesar: En Economipedia, queremos resolver todas tus dudas. Por eso, hemos recopilado las preguntas ms frecuentes sobre este tema. Si no encuentras la respuesta que buscas, no dudes en dejarnos un comentario. Qu es una ecuación?: Una ecuación es una afirmación de que dos expresiones son iguales, contentiendo al menos una incgnita que debemos resolver. Cmo se representan las incgnitas en una ecuación?: Generalmente, las incgnitas se representan con las ltimas letras del alfabeto, como x, y o z. Qu significa resolver una ecuación?: Resolver una ecuación significa encontrar el valor o valores de las incgnitas que hacen que la igualdad sea verdadera.

</