Continue

com gelo. Se se sente nauseado quando acorda de manhã, coma algumas crackers ou alimentos ricos em proteína, como queijo, antes de se levantar. Se faz quimioterapia, durante a administração do tratamento, tende distrair-se, lendo, ouvindo rádio, vendo televisão ou conversando. Apanhe ar fresco, abrindo uma janela ou usando um ventoinha. Consuma gengibre, quer em chá ou cristalizado. Já para tratar os vômitos, algumas estratégias que pode adotar são: Aumentar gradualmente a quantidade de líquidos que ingere. Evitar alimentos sólidos até que o episódio de vômitos tenha passado. Descansar. Interrromper temporariamente a toma de fármacos orais, que podem irritar o estômago e agravar os vômitos. Se os vômitos e diarreia durarem mais de 24 horas, deve tomar uma solução de hidratação oral para prevenir e tratar a desidratação. Se está a fazer tratamentos Atualmente existem medicamentos antieméticos muito eficazes que permitem prevenir ou limitar, consideravelmente, os efeitos das náuseas e a vontade de vomitar. Estes serão administrados no início de cada tratamento de forma intravenosa ou em comprimidos ou supositórios. Fale com o seu médico se... Quando as náuseas duram há mais de uma semana ou se existe a possibilidade de se deverem a uma gravidez, a pessoa deve consultar o seu médico assistente. Normalmente, os vômitos começam a melhorar após seis a 24 horas e podem ser tratados em casa. Se os cuidados que tem em casa não forem suficientes, se está desidratado ou se tem algum tipo de lesão (por exemplo, na cabeça ou uma infeção) deve consultar o seu médico assistente. Nos mais novos, se a criança tem menos de 6 anos, leve-a ao médico se: Os vômitos já se prolongam há várias horas Existe diarreia associada Estão presentes sinais de desidratação A febre é superior a 37,8º Não urina há mais de seis horas Em crianças com mais de 6 anos, é motivo para ir ao médico se: Os vômitos duram há mais de um dia; A diarreia e vômitos ocorrem há mais de 24 horas; Existem sinais de desidratação; A febre é superior a 38,9º Não urina há mais de 6 horas. Independentemente da idade, deve ir imediatamente ao médico se ocorrem sintomas como: Sangue no vomitado Dores de cabeça fortes ou rigidez no pescoço Letargia Confusão Diminuição do estado de alerta Dor abdominal forte Vômitos com febre superior a 38º Diarreia associada aos vômitos Respiração ou pulsação acelerada