I'm not a robot



```
Contumax se administra por vía oral. Adultos: salvo indicaciones diferentes del médico, la usual para un estreñimiento ocasional es de 17 g de polvo al día durante 7 a 14 días disuelto en 250 ml de agua hervida, jugo, café o té y se sugiere tomarla `por la mañana. ¿Cuánto tarda en hacer efecto el medicamento Contumax? Cómo tomar CONTUMAX
Dado que el efecto laxante se manifiesta de 8 a 12 horas después de haber tomado Contumax, es preferible que se administración es oral y la dosis es
de 17g disuelta en 240ml de agua. La mezcla debe administrarse cada 24 horas. ¿Qué pasa si tomo mucho Contumax? El uso frecuente, prolongado o excesivo de CONTUMAX® Macrogol 3350, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes. En pacientes geriátricos residentes en casas de retiro se ha observado con
mayor frecuencia diarrea con la dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol? La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol. La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol. La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo se prepara el macrogol. La dosis recomendada de 17 g. ¿Cómo s
en un vaso de agua (unos 100 ml) y beba la mezcla inmediatamente. ¿Cómo se toma el macrogol 3350? El polietilenglicol 3350 viene como un polvo para ser mezclado con un líquido y tomado por vía oral. Por lo general se toma 1 vez al día según sea necesario hasta por 2 semanas. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del
medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. ¿Qué contiene: Contumax sobres? CONTUMAX Sobres. Composición: Cada sobre con polvo contiene: Macrogol 3350 17 g. Indicaciones: Tratamiento del estreñimiento ocasional. ¿Cuál es el laxante más efectivo? Los laxantes funcionan de diferentes maneras, y la
eficacia de cada tipo de laxante varía según la persona. En general, los laxantes formadores de masa, también conocidos como suplementos de fibra, son los más suaves para el cuerpo y los más seguros de usar a largo plazo. Metamucil y Citrucel entran en esta categoría. ¿Cómo tomar Contumax para colonoscopia? Indicaciones uso de laxante
CONTUMAX Luego ingerir dos vasos adicionales de agua hasta la marca del dosificador. Primera dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 12 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 10 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 10 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 10 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 10 horas antes del procedimiento. Segunda dosis: 2° Frasco junto a 2 vasos de agua. 10 horas antes del procedimiento. Segunda dos segundas 
Funcionan al causar que el agua sea retenida con las heces (materia fecal). Esto aumenta el número de evacuaciones intestinales y ablanda las heces para que pasen más fácilmente. ¿Cómo actúa el macrogol? El macrog
de las heces, provocando la motilidad del colon a través de las vías neuromusculares. ¿Cómo se toma el Solostin macrogol? SOLOSTIN Dosis y vía de administración: Vierta el contenido total de un sobre en 250 mL de agua hervida o purificada, jugo, bebida de sabor embotellada, café o té; se sugiere tomarla por la mañana. Hecha la mezcla,
adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante. Si tiene alguna duda, consulte a su médico. Nombre comercial: Contumax / Solostin. Nombre genérico: Polietilenglicol o Macrogol. Sirve para: Aliviar el estreñimiento como ocasionales. Ayuda a
incrementar el movimiento intestinal y además a retener agua en las heces haciéndolas más blandas y por lo tanto facilitando la evacuación. Contumax sirve para aliviar síntomas como: Estreñimiento manifestado cuando hay menos de 3 evacuación. Contumax sirve para aliviar síntomas como: Estreñimiento manifestado cuando hay menos de 3 evacuación.
duras en más del 25% de las defecaciones. Requerimiento de llevar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia. El Contumax puede recetarse incluso cuando no existe evidencia de que el estreñimiento es un problema crónico ya que en caso de no necesitarlo, el cuerpo lo evacúa por completo en las heces. La única molestia en tal
caso sería la presencia de diarrea. Es además un medicamento que puede recetarse en repetidas ocasiones pues el cuerpo no genera resistencia a su compuesto químico. Es importante que si el paciente presenta náusea, vómito, dolor abdominal, estrechamiento del ano o síntomas que sugieran una obstrucción intestinal se realicen primero estudios
de laboratorio antes de recetar este fármaco. Presentaciones y Forma de Administración Sobres con 17 g de polvo en cajas de 15 y 30 piezas. Frasco con 225 g de polvo en cajas de 15 y 30 piezas. Frasco con 225 g de polvo en cajas de 15 y 30 piezas.
por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Polvo laxante 10 g 17 g 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MÉDICO ** Contumax no debe recetarse a menores de 3 años. La dosis recomendada puede medirse de la presentación de frasco usando la tapa del mismo la cual presenta dos graduaciones: 10 gramos para la
dosis pediátrica y 17 g para adultos. Los adultos pueden optar por la presentación en sobres; un sobre equivale a una dosis. Se sugiere tomar Contumax por las mañana y no debe ingerirse directamente, debe diluirse previamente en 250 ml de agua hervida o purificada, jugo, bebida de sabor, café o té. La acción de este laxante puede no notarse
inmediatamente, se recomienda esperar incluso hasta 72 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 7 a 14 días según lo recomendado por el médico. Generales. Este medicamento está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal. No se debe administrar a menores de 3 años.
Alergias o hipersensibilidad. Hipersensibilidad al macrogol 3350. Mezclar con otros medicamentos. Si bien no existen estudios específicos, en las pruebas clínicas que se han hecho no se ha encontrado ninguna interacción
medicamentosa. Compatibilidad de Contumax en embarazo y lactancia EMBARAZO BAJO Durante el embarazo el riesgo de consumo de macrogol durante el periodo de gestación; sin
embargo, dado que no es absorbido por el cuerpo y es excretado por completo al defecar no se considera que existe ningún riesgo potencial para el feto. La composición química del Contumax hace que sea poco probable que se excrete por la leche materna razón por la cual la Liga de la Leche considera seguro tomarlo durante la lactancia. Los
laboratorios farmacéuticos, las Sociedades Científicas y las agencias de control de fármacos de diferentes países consideran que este medicamento es compatible con la lactancia. Efectos secundarios en 1 persona de cada 100: Náusea, inflamación abdominal, calambres y
flatulencia. En ancianos que toman dosis altas puede producirse diarrea o un mayor número de evacuaciones al día. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas consulte inmediatamente a su médico. Tratamiento del estreñimiento del estreñimiento del estreñimiento. Composición Cada sobre con polvo contiene: Polietilenglicol 3350 17.0 g por sobre. Indicaciones Tratamiento del estreñimiento del estreñimie
estreñimiento ocasional o crónico que reúnan uno o más de los siguientes criterios de Roma II para el estreñimiento funcional: Menos de 3 evacuaciones. Presencia de heces duras, terrones (fecalitos) en más de 25% de las defecaciones.
Sensación de evacuación incompleta en más de 25% de las evacuación en 25% de las veces. CONTUMAX® retiene agua en las heces, dándole una consistencia suave e incrementando la frecuencia de
los movimientos intestinales. Dosis Administrarse por vía oral para el tratamiento del estreñimiento ocasional y del crónico. La acción de los laxantes en pacientes con una historia clínica de estreñimiento puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal. Se sugiere no aumentar la dosis diaria ni la frecuencia de
la administración, deberá esperarse la respuesta en un tiempo máximo de 72 horas. Adultos: La dosis recomendada de CONTUMAX® para un estreñimiento ocasionado por el uso de analgésicos opioides, la dosis diaria es de 17 g durante el tiempo que se
mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante 7 a 14 días. La dosis de CONTUMAX® debe ser disuelta en 250 mL de agua hervida o purificada, jugo, bebida de sabor embotellada, y se sugiere tomarla por la mañana. Contraindicaciones CONTUMAX® no se
debe administrar a menores de 2 años, ni a pacientes con diagnóstico o con síntomas sospechosos de obstrucción intestinal (náusea, vómito, dolor abdominal o distensión) de cualquier etiología o con alergia conocida al polietilenglicol. Efectos secundarios Puede presentarse: Náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. Las dosis altas
pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones, particularmente en los ancianos, lo cual puede ser a consecuencia de un desequilibrio hidroelectrolítico. Precauciones Los pacientes con estreñimiento deben ser evaluados con una historia clínica detallada que incluya un examen físico completo para evaluar las condiciones metabólicas,
endocrinas y neurológicas asociadas, así como la medicación concomitante que estén tomando y que pudiera contribuir o agravar el estreñimiento. En algunos pacientes con síntomas sugerentes de obstrucción intestinal como
Náusea, vómito, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Los pacientes deben ser informados sobre hábitos alimenticios y defecatorios adecuados (como dietas con alto contenido de fibra) y cambios del estilo de vida (ingesta adecuados y ejercicio regular) con el objetivo de mejorar el
funcionamiento intestinal. El uso frecuente, prolongado o excesivo de CONTUMAX®, polietilenglicol 3350, puede ocasionar un deseguilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes. En pacientes geriátricos residentes en casas de retiro se ha observado con mayor frecuencia diarrea con la dosis recomendada de 17 g. Si esto sucede,
CONTUMAX® debe ser suspendido. La acción de los laxantes en pacientes con historia clínica de estreñimiento puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producción en modelo animal. También, se
desconoce si CONTUMAX®, polietilenglicol 3350 puede causar daño fetal cuando es administrado durante el embarazo o que afecte la capacidad reproductiva. Dado que el polietilenglicol prácticamente no se absorbe en el intestino, su empleo durante el embarazo o en el periodo de lactancia queda a juicio del médico. Interacciones CONTUMAX®,
polietilenglicol 3350, no ha demostrado tener interacción con otros medicamentos. Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, teratogénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: No hay estudios de carcinogénesis, teratogénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: No hay estudios de carcinogénesis, teratogénesis, teratogén
la reproducción en un modelo animal. Conservación Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C. Sobredosis No se han reportado casos de sobredosis de CONTUMAX®, polietilenglicol 3350, se puede presentar deshidratación debida a la diarrea.
Administrar líquidos suficientes. Presentación Caja con 15 sobres con 17 g de polvo para solución oral (Reg. San. INVIMA 2010M- 0011380). Precio y ubicación Tenemos relaciones con diferentes laboratorios y es posible que Unión de Vértices de Tecnofarma S.A. nos haya dado información que nos permita aclararte ¿dónde se consigue CONTUMAX?
o ¿cuánto cuesta CONTUMAX?. Sólo déjanos un comentario abajo o envíanos un mensaje usando nuestra sección de contumax / Solostin. Nombre genérico: Polietilenglicol o Macrogol. Sirve para: Aliviar el estreñimiento.
Contumax es un laxante que se puede usar para aliviar problemas de estreñimiento tanto crónicos como ocasionales. Ayuda a incrementar el movimiento tanto facilitando la evacuación. Contumax sirve para aliviar síntomas como: Estreñimiento manifestado cuando hay
menos de 3 evacuaciones a la semana. Necesidad de esfuerzo excesivo al defecar en al menos 1 de cada 4 ocasiones. Heces duras en más del 25% de las defecaciones a la semana. Necesidad de esfuerzo excesivo al defecar en al menos 1 de cada 4 ocasiones. Heces duras en más del 25% de las defecaciones. El Contumax puede recetarse incluso cuando no existe evidencia de que el estreñimiento es un
problema crónico ya que en caso de no necesitarlo, el cuerpo lo evacúa por completo en las heces. La única molestia en tal caso sería la presencia de diarrea. Es además un medicamento que puede recetarse en repetidas ocasiones pues el cuerpo no genera resistencia a su compuesto químico. Es importante que si el paciente presenta náusea, vómito,
dolor abdominal, estrechamiento del ano o síntomas que sugieran una obstrucción intestinal se realicen primero estudios de laboratorio antes de recetar este fármaco. Presentaciones y Forma de Administración Sobres con 17 g de polvo en cajas de 15 y 30 piezas. Frasco con 225 g de polvo con tapa dosificadora. Fabricados por los Laboratorios
Asofarma de México y More Pharma en las marca comercial Contumax y Solostin. Dosis del Contumax y Usos Recomendados por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Polvo laxante 10 g 17 g 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MÉDICO ** Contumax no debe recetarse a menores de 3 años. La dosis
recomendada puede medirse de la presentación de frasco usando la tapa del mismo la cual presentación en sobres; un sobre equivale a una dosis. Se sugiere tomar Contumax por las mañana y no debe ingerirse directamente, debe
diluirse previamente en 250 ml de agua hervida o purificada, jugo, bebida de sabor, café o té. La acción de este laxante puede no notarse inmediatamente, se recomienda esperar incluso hasta 72 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 7 a 14 días según lo recomendado por el médico. Generales. Este medicamento
está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal. No se debe administrar a menores de 3 años. Alergias o hipersensibilidad. Hipersensibilidad al macrogol 3350. Mezcla con Alcohol. No existen estudios que demuestren que exista una afección grave en caso de mezclarse con el alcohol. Mezclar con otros
medicamentos. Si bien no existen estudios específicos, en las pruebas clínicas que se han hecho no se ha encontrado ninguna interacción medicamentosa. Compatibilidad de Contumax en embarazo y lactancia EMBARAZO BAJO Durante el embarazo y la embarazo y 
fabricantes de Contumax reportan que no existen estudios sobre el riesgo de consumo de macrogol durante el periodo de gestación; sin embargo, dado que no es absorbido por el cuerpo y es excretado por completo al defecar no se considera que existe ningún riesgo potencial para el feto. La composición química del Contumax hace que sea poco
probable que se excrete por la leche materna razón por la cual la Liga de la Leche considera seguro tomarlo durante la lactancia. Los laboratorios farmacéuticos, las Sociedades Científicas y las agencias de control de fármacos de diferentes países consideran que este medicamento es compatible con la lactancia. Efectos secundarios El uso de
Contumax puede ocasionar los siguientes efectos secundarios en 1 persona de cada 100: Náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. En ancianos que toman dosis altas puede producirse diarrea o un mayor número de evacuaciones al día. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas consulte inmediatamente a su médico. Nombre
comercial: Contumax / Solostin. Nombre genérico: Polietilenglicol o Macrogol. Sirve para: Aliviar el estreñimiento como ocasionales. Ayuda a incrementar el movimiento intestinal y además a retener agua en las heces haciéndolas más blandas y por lo
tanto facilitando la evacuación. Contumax sirve para aliviar síntomas como: Estreñimiento manifestado cuando hay menos de 3 evacuaciónes. Heces duras en más del 25% de las defecaciones. Requerimiento de llevar a cabo procedimientos de evacuación
manuales con frecuencia. El Contumax puede recetarse incluso cuando no existe evidencia de que el estreñimiento es un problema crónico ya que en caso de no necesitarlo, el cuerpo lo evacúa por completo en las heces. La única molestia en tal caso sería la presencia de diarrea. Es además un medicamento que puede recetarse en repetidas ocasiones
pues el cuerpo no genera resistencia a su compuesto químico. Es importante que si el paciente presenta náusea, vómito, dolor abdominal, estrechamiento del ano o síntomas que sugieran una obstrucción intestinal se realicen primero estudios de laboratorio antes de recetar este fármaco. Presentaciones y Forma de Administración Sobres con 17 g de
polvo en cajas de 15 y 30 piezas. Frasco con 225 g de polvo con tapa dosificadora. Fabricados por los Laboratorios Asofarma de México y More Pharma en las marca comercial Contumax y Usos Recomendados por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Polvo laxante 10 g 17 g 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER
SIEMPRE RECETADA POR UN MEDICO ** Contumax no debe recetarse a menores de 3 años. La dosis recomendada puede medirse de la presentación de frasco usando la tapa del mismo la cual presentación en sobres; un sobre
equivale a una dosis. Se sugiere tomar Contumax por las mañana y no debe ingerirse directamente, debe diluirse previamente en 250 ml de agua hervida o purificada, jugo, bebida de sabor, café o té. La acción de este laxante puede no notarse inmediatamente, se recomienda esperar incluso hasta 72 horas para ver los primeros resultados y continuar
el tratamiento durante 7 a 14 días según lo recomendado por el médico. Generales. Este medicamento está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal. No se debe administrar a menores de 3 años. Alergias o hipersensibilidad. Hipersensibilidad al macrogol 3350. Mezcla con Alcohol. No existen estudios que
demuestren que exista una afección grave en caso de mezclarse con el alcohol. Mezclar con otros medicamentos. Si bien no existen estudios específicos, en las pruebas clínicas que se han hecho no se ha encontrado ninguna interacción medicamentosa. Compatibilidad de Contumax en embarazo y lactancia EMBARAZO BAJO LACTANCIA BAJO
RIESGO BAJO Durante el embarazo el riesgo de consumo es bajo; los laboratorios farmacéuticos fabricantes de Contumax reportan que no existen estudios sobre el riesgo de consumo de macrogol durante el periodo de gestación; sin embargo, dado que no es absorbido por el cuerpo y es excretado por completo al defecar no se considera que existe
ningún riesgo potencial para el feto. La composición química del Contumax hace que sea poco probable que se excrete por la leche materna razón por la cual la Liga de la Leche considera seguro tomarlo durante la lactancia. Los laboratorios farmacéuticos, las Sociedades Científicas y las agencias de control de fármacos de diferentes países
consideran que este medicamento es compatible con la lactancia. Efectos secundarios en 1 persona de cada 100: Náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. En ancianos que toman dosis altas puede producirse diarrea o un mayor número de evacuaciones al día. En
caso de presentar cualquiera de estos síntomas consulte inmediatamente a su médico. Contumax (Sodium Picosulfate) is a triarylmethane group derivative stimulant laxative form then stimulates the nerve endings of the intestinal wall and results in
colonic peristalsis with promotion of accumulation of the stool. Stimulation of the rectum causes increased motility and a feeling of rectal fullness. The rectal effect may help to restore the "call to stool". Contumax (Sodium
Picosulfate) is used for the following conditions. For oral administration Bowel clearance before surgery, childbirth or radiological investigations. For oral administration. The following morning. It is recommended to
start with the lowest dose. The dose may be adjusted up to the maximum recommended dose to produce regular stools. The maximum recommended dose to produce regular stools.
mg per day. Oral Solution: 2.5-5 ml or Half to one teaspoonful per day. Children under 4 years of age- Oral Solution: 0.25 ml/kg body weight per day. Hypersensitivity, dizziness, syncope, vasovagal response, gastrointestinal disorders, diarrhea, abdominal pain and abdominal cramps, nausea, vomiting. Prolonged excessive use may lead to fluid and
electrolyte imbalance and hypokalemia. Harmful for those suffering from alcoholism. To be taken into account in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups such as patients with liver disease or epilepsy. Interaction The concomitant use of diuretics or adreno-corticosteroids may increase the risk of electrolyte imbalance if
excessive doses are taken. Concurrent administration of antibiotics may reduce the laxative action of this product. There are no reports of undesirable or damaging effects during pregnancy or to the foetus attributable to the use of this product. There are no reports of undesirable or damaging effects during the first trimester. Clinical data show that neither the active
moiety of sodium Picosulfate (BHPM or bis-(p hydroxyphenyl)-pyridyl-2-methane) nor its glucuronides are excreted into the milk of healthy lactating females. Contraindication Ileus or intestinal obstruction, severe painful and/or feverish acute inflammatory
bowel diseases, severe dehydration, known hypersensitivity to Contumax (Sodium Picosulfate) or any other component of the product. Laxatives when taken in chronic overdosage may cause chronic diarrhea, abdominal pain, hypokalemia, secondary hyperaldosteronism, and renal calculi. Renal tubular damage, metabolic alkalosis, and muscle
weakness secondary to hypokalemia have also been described in association with chronic laxative abuse. Storage Condition Keep below 30°C temperature, away from light & moisture. Keep out of the reach of children. Innovators Monograph Contumax (Sodium Picosulfate), magnesium oxide, and anhydrous citric acid is used in adults and children 9
condition. A satisfactory response (normal stool consistency, not requiring enemas, suppositories or manual evacuation, no significant adverse event) was achieved in 15/20 evaluable patients. Contumax (Sodium Picosulfate) works by encouraging the muscles in your bowel to move waste products through your body. Common side effects of Contumax
(Sodium Picosulfate) are include: a light-headed feeling, like you might pass out; confusion; irregular heartbeats; a seizure; little or no urination; severe nausea or vomiting; painful bloating, severe stomach cramps; rectal bleeding; No studies have been carried out to examine whether using Contumax (Sodium Picosulfate) during pregnancy is linked
to problems in the unborn baby. No problems have been reported following use during pregnancy. Contumax (Sodium Picosulfate) is not detectable in breastmilk. Contumax (Sodium Picosulfate) is not detectable in breastmilk.
are required. Contumax (Sodium Picosulfate) works by encouraging the muscles in your body. This helps you to go to the toilet. It usually has an effect within 6-12 hours. Contumax (Sodium Picosulfate) should be taken at night to produce relief from constipation the following morning. Contumax (Sodium Picosulfate) works by encouraging the muscles in your body. This helps you to go to the toilet. It usually has an effect within 6-12 hours.
Picosulfate) is usually given once each day. This is usually at bedtime. Give the medicine at about the same time each day so that this becomes part of your child's routine, which will help you to remember. Contumax (Sodium Picosulfate) should not
be taken on a continuous daily basis for more than five days without investigating the cause of constipation. Long-term everyday use of stimulant laxatives may harm the intestinal function and should be avoided. Contumax (Sodium Picosulfate) is not recommended for use in children below the age of 10 years. Consult your doctor before using this
medicine, if you are pregnant or are breastfeeding. Contumax (Sodium Picosulfate) is not recommended if you have any dehydration, electrolyte imbalance, stomach or intestine blockage disorders. Kidney disease, mild to moderate—Use with caution. This medicine may cause fluid and electrolyte imbalances, which may lead to serious unwanted
effects, including heart rhythm problems, seizures, or kidney problems. Your doctor should correct these imbalances before you or your child start taking this medicine. Contumax (Sodium Picosulfate) should not be taken on a continuous daily basis for more than five days without investigating the cause of constipation. Long-term everyday use of
stimulant laxatives may harm the intestinal function and should be avoided. Call your doctor if you cannot drink the entire amount of medicine and liquids as instructed in time for your colonoscopy. Seek emergency medical attention. Overdose can cause severe dehydration (severe headache or dizziness, vomiting, being unable to urinate). An
overdose is unlikely to occur if you take citric acid, magnesium oxide, and sodium picosulfate exactly as directed. Contumax (Sodium Picosulfate) exactly as directed. Contumax (Sodium Picosulfate). *** Taking medicines
without doctor's advice can cause long-term problems. Nombre genérico: Polietilenglicol o Macrogol. Sirve para: Aliviar el estreñimiento tanto crónicos como ocasionales. Ayuda a incrementar el movimiento intestinal y
además a retener agua en las heces haciéndolas más blandas y por lo tanto facilitando la evacuación. Contumax sirve para aliviar síntomas como: Estreñimiento manifestado cuando hay menos de 3 evacuaciones a la semana. Necesidad de esfuerzo excesivo al defecar en al menos 1 de cada 4 ocasiones. Heces duras en más del 25% de las
defecaciones. Requerimiento de llevar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia. El Contumax puede recetarse incluso cuando no existe evidencia de que el estreñimiento es un problema crónico ya que en caso de no necesitarlo, el cuerpo lo evacúa por completo en las heces. La única molestia en tal caso sería la presencia de
diarrea. Es además un medicamento que puede recetarse en repetidas ocasiones pues el cuerpo no genera resistencia a su compuesto químico. Es importante que si el paciente presenta náusea, vómito, dolor abdominal, estrechamiento del ano o síntomas que sugieran una obstrucción intestinal se realicen primero estudios de laboratorio antes de
recetar este fármaco. Presentaciones y Forma de Administración Sobres con 17 g de polvo en cajas de 15 y 30 piezas. Frasco con 225 g de polvo con tapa dosificadora. Fabricados por los Laboratorios Asofarma de México y More Pharma en las marca comercial Contumax y Solostin. Dosis del Contumax y Usos Recomendados por Edad Presentación 0
a 12 años Adultos Veces al día Polvo laxante 10 g 17 g 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MÉDICO ** Contumax no debe recetarse a menores de 3 años. La dosis recomendada puede medirse de la presentación de frasco usando la tapa del mismo la cual presenta dos graduaciones: 10 gramos para la dosis pediátrica y 17 g
para adultos. Los adultos pueden optar por la presentación en sobres; un sobre equivale a una dosis. Se sugiere tomar Contumax por las mañana y no debe ingerirse directamente, debe diluirse previamente en 250 ml de agua hervida o purificada, jugo, bebida de sabor, café o té. La acción de este laxante puede no notarse inmediatamente, se
recomienda esperar incluso hasta 72 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 7 a 14 días según lo recomendado por el médico. Generales. Este medicamento está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal. No se debe administrar a menores de 3 años. Alergias o
hipersensibilidad. Hipersensibilidad al macrogol 3350. Mezclar con Alcohol. No existen estudios que demuestren que exista una afección grave en caso de mezclarse con el alcohol. Mezclar con otros medicamentos. Si bien no existen estudios específicos, en las pruebas clínicas que se han hecho no se ha encontrado ninguna interacción medicamentosa
Compatibilidad de Contumax en embarazo y lactancia EMBARAZO BAJO Durante el embarazo y lactancia EMBARAZO BAJO Durante el embarazo de consumo de macrogol durante el periodo de gestación; sin embargo, dado que no
es absorbido por el cuerpo y es excretado por completo al defecar no se considera que existe ningún riesgo potencial para el feto. La composición química del Contumax hace que sea poco probable que se excrete por la leche materna razón por la cual la Liga de la Leche considera seguro tomarlo durante la lactancia. Los laboratorios farmacéuticos,
las Sociedades Científicas y las agencias de control de fármacos de diferentes países consideran que este medicamento es compatible con la lactancia. Efectos secundarios en 1 persona de cada 100: Náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. En ancianos que toman
dosis altas puede producirse diarrea o un mayor número de evacuaciones al día. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas consulte inmediatamente a su médico. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada sobre contiene: Macrogol 3350 17.0 gCada frasco contiene: Macrogol 3350 255.00, 510.00 g INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
"Laxante". Tratamiento de la constipación ocasional o crónica que reúnan uno o más de los siguientes criterios de Roma II para la constipación funcional: • Menos de 3 evacuaciones. • Presencia de heces duras, terrones, (fecalitos) en más del
25% de las defecaciones. • Sensación de evacuación en un 25% de las vecesidad de procedimientos manuales con el fin de facilitar la evacuación en un 25% de las veces. CONTUMAX® retiene agua en las heces dándole una consistencia suave
e incrementando la frecuencia de los movimientos intestinales. FARMACOCINÉTICA Y FAR
sujetos sanos sin estreñimiento, de hecho, hay una recuperación completa del Macrogol es parcial y variable. Esto no significa que Macrogol se absorba en el intestino; pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino no mostraron una absorción mayor en
comparación con sujetos normales. Estudios in vitro mostraron indirectamente que Macrogol 3350 no fue fermentado a hidrógeno o metanol por la microflora del colon en las heces humanas. No se ha demostrado que CONTUMAX®, Macrogol 3350 tenga algún efecto sobre la absorción activa y la secreción de glucosa o electrólitos. No produce
taquifilaxia. CONTRAINDICACIONES: CONTUMAX® está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal y en pacientes que presenten hipersensibilidad al Macrogol 3350.No se administre a menores de 3 años. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se han realizado estudios
durante la reproducción en modelo animal. También, se desconoce si CONTUMAX®, Macrogol 3350 puede causar daño fetal cuando es administrado durante el embarazo o que afecte la capacidad reproductiva.Dado que el Macrogol prácticamente no se absorbe en el intestino, su empleo durante el embarazo o en el periodo de lactancia queda a
juicio del médico. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse: náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. Las dosis altas puede ser a consecuencia de un desequilibrio hidroelectrolítico. PRECAUCIONES EN
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No hay estudios de carcinogenicidad a largo plazo, ni estudios de toxicidad genética o de toxicidad reproductiva en animales. No se han realizado estudios durante la reproducción en un modelo animal. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: CONTUMAX®, Macrogol 3350, no ha demostrado tener interacción con otros medicamentos. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se ha demostrado un efecto en exámenes de laboratorio clínicamente significativo. PRECAUCIONES GENERALES: Los pacientes con
estudio radiológico o endoscópico del colon.Debe evitarse el uso de CONTUMAX® en pacientes con síntomas sugerentes de obstrucción intestinales).Los pacientes deben ser informados sobre hábitos alimenticios y defecatorios adecuados (como
dietas con alto contenido de fibra) y cambios del estilo de vida (ingesta adecuada de líquidos y ejercicio regular) con el objetivo de mejorar el funcionamiento intestinal. El uso frecuente, prolongado o excesivo de CONTUMAX®, Macrogol 3350, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes. En pacientes geriátricos
residentes en casas de retiro se ha observado con mayor frecuencia diarrea con la dosis recomendada de 17 g. Si esto sucede, CONTUMAX® debe ser suspendido.La acción de los laxantes en pacientes con historia clínica de constipación puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal. DOSIS Y VÍA DE
ADMINISTRACIÓN: Administrarse por vía oral para el tratamiento de la constipación puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal. Se sugiere no aumentar la dosis diaria ni la frecuencia de la
administración, deberá esperarse la respuesta en un tiempo máximo de 72 horas. Adultos: La dosis recomendada de CONTUMAX® para un estreñimiento ocasionada por el uso de analgésicos opioides; la dosis diaria es de 17 g. durante el tiempo que se
mantenga la terapia opioide, o bien, la causa de la constipación crónica. Pediatría: Pacientes de 3 años en adelante, 10 g por día, durante 7 a 14 días. La dosis recomendada puede disponerse de dos maneras: con la presentación en sobres unidosis, o bien, directamente del frasco. La tapa del frasco de CONTUMAX® es una medida dosificadora ya que a función en sobres unidosis, o bien, directamente del frasco de CONTUMAX® es una medida dosificadora ya que a función en sobres unidosis, o bien, directamente del frasco de CONTUMAX® es una medida dosificadora ya que a función en sobres unidosis, o bien, directamente del frasco de CONTUMAX® es una medida dosificadora ya que a función en sobres unidosis, o bien, directamente del frasco de CONTUMAX® es una medida dosificadora ya que a función en sobres unidosis, o bien, directamente del frasco de CONTUMAX® es una medida dosificadora ya que a función de función d
proporciona la dosis requerida y presenta 2 graduaciones, una de 10 g dosis pediátrica y otra de 17 g dosis pediátrica y otra de 18 g dosis pediátrica y otra de 19 g dosis pediátrica y otra de 19 g dosis pediátrica y otra de 19 g dosis pediátrica y otra de 10 g dosis pediátrica y otra 
 MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosis. La producción de diarrea sería el evento esperado más importante. Ante una sobredosis de CONTUMAX®, Macrogol 3350, se puede presentar deshidratación debida a la diarrea. Administrar líquidos suficientes. PRESENTACIONES: Caja con
15 sobres con 17 g de polvo para solución oral.Caja con un frasco de polietileno con 510 g de polvo para solución oral. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de
30°C y en lugar seco. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Vía de Administración: oral. Su venta requiere receta médico. Hecho en México por:
Emifarma, S.A. de C.V. Adolfo López Mateos No. 5 Santa Clara, C.P. 55540, Ecatepec de Morelos, México Para: ASOFARMA DE MÉXICO, S.A. de C.V. Calz. México. Reg. Núm. 137M2004, SSA IV 113300415C0123/Dic2011 Tratamiento del
estreñimiento.Composición.Cada sobre con polvo contiene: Polietilenglicol 3350 17.0 g por sobre. Farmacología.Polietilenglicol 3350 es un agente osmótico que induce la retención de agua por la materia fecal, con lo cual ésta aumenta su volumen, reblandeciendo su consistencia y facilitando su eliminación. El polietilenglicol 3350 no es absorbido en
sujetos sanos sin estreñimiento, de hecho, hay una recuperación completa del polietilenglicol 3350 (PEG 3350) en heces. En sujetos constipados la recuperación del PEG es parcial y variable. Esto no significa que PEG 3350 se absorba en el intestino; pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino no mostraron una absorción mayor en
comparación con sujetos normales. Estudios in vitro mostraron indirectamente que polietilenglicol 3350 no fue fermentado a hidrógeno o metanol por la microflora del colon en las heces humanas. No se ha demostrado que CONTUMAX®, polietilenglicol 3350 tenga algún efecto sobre la absorción activa y la secreción de glucosa o electrolitos. No
produce taquifilaxia. Indicaciones. Tratamiento del estreñimiento ocasional o crónico que reúnan uno o más de los siguientes criterios de Roma II para el estreñimiento funcional: Menos de 3 evacuaciones en siete días con ingesta normal de alimentos. Esfuerzo a la defecación en más de 25% de las evacuaciones. Presencia de heces duras, terrones
(fecalitos) en más de 25% de las defecaciones. Sensación de evacuación incompleta en más de 25% de las evacuación en 25% de las veces. CONTUMAX®retiene agua en las heces, dándole una
consistencia suave e incrementando la frecuencia de los movimientos intestinales. Dosificación. Administrarse por vía oral para el tratamiento del estreñimiento puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento
intestinal. Se sugiere no aumentar la dosis diaria ni la frecuencia de la administración, deberá esperarse la respuesta en un tiempo máximo de 72 horas. Adultos:La dosis recomendada de CONTUMAX® para un estreñimiento ocasional es de 17 g de polvo por día durante 7 a 14 días. En estreñimiento crónico, como el ocasionado por el uso de
analgésicos opioides, la dosis diaria es de 17 g durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico. Pediatría: Pacientes de 2 años en adelante, 10 g por día, durante el tiempo que se mantenga la terapia opioide, o bien, la causa del estreñimiento crónico.
sugiere tomarla por la mañana. Contraindicaciones.CONTUMAX®no se debe administrar a menores de 2 años, ni a pacientes con diagnóstico o con síntomas sospechosos de obstrucción intestinal (náusea, vómito, dolor abdominal o distensión) de cualquier etiología o con alergia conocida al polietilenglicol. Reacciones adversas.Puede presentarse
Náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. Las dosis altas pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones, particularmente en los ancianos, lo cual puede ser a consecuencia de un desequilibrio hidroelectrolítico. Precauciones con estreñimiento deben ser evaluados con una historia clínica detallada que
incluya un examen físico completo para evaluar las condiciones metabólicas, endocrinas y neurológicas asociadas, así como la medicación concomitante que estén tomando y que pudiera contribuir o agravar el estreñimiento. En algunos pacientes será importante realizar un estudio radiológico o endoscópico del colon. Debe evitarse el uso de
CONTUMAX®en pacientes con síntomas sugerentes de obstrucción intestinal como: Náusea, vómito, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Los pacientes de obstrucción intestinal como: Náusea, vómito, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Los pacientes de obstrucción intestinal como: Náusea, vómito, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Los pacientes de obstrucción intestinal como: Náusea, vómito, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales.
(ingesta adecuada de líquidos y ejercicio regular) con el objetivo de mejorar el funcionamiento intestinal. El uso frecuente, prolongado o excesivo de CONTUMAX®, polietilenglicol 3350, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes. En pacientes geriátricos residentes en casas de retiro se ha observado con mayor
frecuencia diarrea con la dosis recomendada de 17 g. Si esto sucede, CONTUMAX®debe ser suspendido. La acción de los laxantes en pacientes con historia clínica de estreñimiento puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:No se han realizado
estudios durante la reproducción en modelo animal. También, se desconoce si CONTUMAX®, polietilenglicol 3350 puede causar daño fetal cuando es administrado durante el embarazo o que afecte la capacidad reproductiva. Dado que el polietilenglicol prácticamente no se absorbe en el intestino, su empleo durante el embarazo o en el periodo de
lactancia queda a juicio del médico. Interacciones.CONTUMAX®, polietilenglicol 3350, no ha demostrado tener interacción con otros medicamentos. Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, teratogénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad:No hay estudios de carcinogenicidad a largo plazo, ni estudios de toxicidad genética o de
toxicidad reproductiva en animales. No se han realizado estudios durante la reproducción en un modelo animal. Conservación. Conservación de diarrea sería el evento esperado más importante. Ante una sobredosis de CONTUMAX®
polietilenglicol 3350, se puede presentar deshidratación debida a la diarrea. Administrar líquidos suficientes. Presentación. Caja con 15 sobres con 17 g de polvo para solución oral (Reg. San. INVIMA 2010M- 0011380). Este es un listado de algunos de los medicamentos, fármacos relacionados con CONTUMAX. Nombre comercial: Contumax /
 Solostin. Nombre genérico: Polietilenglicol o Macrogol. Sirve para: Aliviar el estreñimiento. Contumax es un laxante que se puede usar para aliviar problemas de estreñimiento tanto crónicos como ocasionales. Ayuda a incrementar el movimiento intestinal y además a retener agua en las heces haciéndolas más blandas y por lo tanto facilitando la
evacuación. Contumax sirve para aliviar síntomas como: Estreñimiento manifestado cuando hay menos de 3 evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de evacuación manuales con frecuencia de levar a cabo procedimientos de levar a cabo procedimiento de levar a cabo procedimiento de levar a 
El Contumax puede recetarse incluso cuando no existe evidencia de que el estreñimiento es un problema crónico ya que en caso de no necesitarlo, el cuerpo lo evacúa por completo en las heces. La única molestia en tal caso sería la presencia de diarrea. Es además un medicamento que puede recetarse en repetidas ocasiones pues el cuerpo no genera
resistencia a su compuesto químico. Es importante que si el paciente presenta náusea, vómito, dolor abdominal, estrechamiento del ano o síntomas que sugieran una obstrucción intestinal se realicen primero estudios de laboratorio antes de recetar este fármaco. Presentaciones y Forma de Administración Sobres con 17 g de polvo en cajas de 15 y 30
piezas. Frasco con 225 q de polvo con tapa dosificadora. Fabricados por los Laboratorios Asofarma de México y More Pharma en las marca comercial Contumax y Usos Recomendados por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Polvo laxante 10 q 17 q 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA
POR UN MÉDICO ** Contumax no debe recetarse a menores de 3 años. La dosis recomendada puede medirse de la presentación de frasco usando la tapa del mismo la cual presentación en sobres; un sobre equivale a una dosis. Se
sugiere tomar Contumax por las mañana y no debe ingerirse directamente, de sabor, café o té. La acción de este laxante puede no notarse inmediatamente, se recomienda esperar incluso hasta 72 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 72 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 72 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 73 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 74 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 75 horas para ver los primeros para ver los
a 14 días según lo recomendado por el médico. Generales. Este medicamento está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal. No se debe administrar a menores de 3 años. Alergias o hipersensibilidad. Hipersensibilidad al macrogol 3350. Mezcla con Alcohol. No existen estudios que demuestren que exista una
afección grave en caso de mezclarse con el alcohol. Mezclar con otros medicamentos. Si bien no existen estudios específicos, en las pruebas clínicas que se han hecho no se ha encontrado ninguna interacción medicamentos. Si bien no existen estudios específicos, en las pruebas clínicas que se han hecho no se ha encontrado ninguna interacción medicamentosa. Compatibilidad de Contumax en embarazo y lactancia EMBARAZO BAJO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Durante el
embarazo el riesgo de consumo es bajo; los laboratorios farmacéuticos fabricantes de Contumax reportan que no existen estudios sobre el riesgo de consumo de macrogol durante el periodo de gestación; sin embargo, dado que no es absorbido por el cuerpo y es excretado por completo al defecar no se considera que existe ningún riesgo potencial
para el feto. La composición química del Contumax hace que sea poco probable que se excrete por la leche materna razón por la cual la Liga de la Leche considera seguro tomarlo durante la lactancia. Los laboratorios farmacéuticos, las Sociedades Científicas y las agencias de control de fármacos de diferentes países consideran que este medicamento
es compatible con la lactancia. Efectos secundarios El uso de Contumax puede ocasionar los siguientes efectos secundarios en 1 persona de cada 100: Náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. En ancianos que toman dosis altas puede producirse diarrea o un mayor número de evacuaciones al día. En caso de presentar cualquiera de
estos síntomas consulte inmediatamente a su médico. Nombre comercial: Contumax / Solostin. Nombre que se puede usar para aliviar problemas de estreñimiento tanto crónicos como ocasionales. Ayuda a incrementar el movimiento intestinal y además
a retener agua en las heces haciéndolas más blandas y por lo tanto facilitando la evacuación. Contumax sirve para aliviar síntomas como: Estreñimiento manifestado cuando hay menos de 3 evacuaciónes a la semana. Necesidad de esfuerzo excesivo al defecar en al menos 1 de cada 4 ocasiones. Heces duras en más del 25% de las defecaciones
Requerimiento de llevar a cabo procedimiento de que el estreñimiento es un problema crónico ya que en caso de no necesitarlo, el cuerpo lo evacúa por completo en las heces. La única molestia en tal caso sería la presencia de diarrea. Es
además un medicamento que puede recetarse en repetidas ocasiones pues el cuerpo no genera resistencia a su compuesto químico. Es importante que sujeran una obstrucción intestinal se realicen primero estudios de laboratorio antes de recetar este
fármaco. Presentaciones y Forma de Administración Sobres con 17 q de polvo en cajas de 15 y 30 piezas. Frasco con 225 q de polvo con tapa dosificadora. Fabricados por los Laboratorios Asofarma de México y More Pharma en las marca comercial Contumax y Usos Recomendados por Edad Presentación 0 a 12 años
Adultos Veces al día Polvo laxante 10 g 17 g 1 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MÉDICO ** Contumax no debe recetarse a menores de 3 años. La dosis recomendada puede medirse de la presentación de frasco usando la tapa del mismo la cual presenta dos graduaciones: 10 gramos para la dosis pediátrica y 17 g para
adultos. Los adultos pueden optar por la presentación en sobres; un sobre equivale a una dosis. Se sugiere tomar Contumax por las mañana y no debe ingerirse directamente, debe diluirse previamente en 250 ml de agua hervida o purificada, jugo, bebida de sabor, café o té. La acción de este laxante puede no notarse inmediatamente, se reco
esperar incluso hasta 72 horas para ver los primeros resultados y continuar el tratamiento durante 7 a 14 días según lo recomendado por el médico. Generales. Este medicamento está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal. No se debe administrar a menores de 3 años. Alergias o hipersensibilidad.
Hipersensibilidad al macrogol 3350. Mezclar con Alcohol. No existen estudios que demuestren que exista una afección grave en caso de mezclarse con el alcohol. Mezclar con otros medicamentos. Si bien no existen estudios específicos, en las pruebas clínicas que se han hecho no se ha encontrado ninguna interacción medicamentosa. Compatibilidad
de Contumax en embarazo y lactancia EMBARAZO BAJO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Durante el embarazo el riesgo de consumo es bajo; los laboratorios farmacéuticos fabricantes de Contumax reportan que no existen estudios sobre el riesgo de consumo de macrogol durante el periodo de gestación; sin embargo, dado que no es absorbido
por el cuerpo y es excretado por completo al defecar no se considera que existe ningún riesgo potencial para el feto. La composición química del Contumax hace que sea poco probable que se excrete por la leche materna razón por la cual la Liga de la Leche considera seguro tomarlo durante la lactancia. Los laboratorios farmacéuticos, las Sociedades
Científicas y las agencias de control de fármacos de diferentes países consideran que este medicamento es compatible con la lactancia. Efectos secundarios en 1 persona de cada 100: Náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. En ancianos que toman dosis altas
puede producirse diarrea o un mayor número de evacuaciones al día. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas consulte inmediatamente a su médico.
```